

Les six principaux signes d'immunodéficience primaire chez l'adulte *

1. Quatre infections ou plus en un an ayant été traitées par des antibiotiques (p. ex. bronchite, otite, sinusite, pneumonie)
2. Infections récurrentes ou infections nécessitant un traitement antibiotique de très longue durée
3. Deux infections bactériennes graves ou plus, telles que l'ostéomyélite, la méningite, la septicémie ou l'inflammation du tissu sous-cutané
4. Deux pneumonies ou plus prouvées par radiographie en l'espace de trois ans
5. Infections présentant une localisation inhabituelle ou causées par un pathogène inhabituel
6. Immunodéficience connue dans la famille

Signes d'alerte annonçant une IDP chez l'adulte conformément aux lignes directrices de l'AWMF**

1. Une prédisposition pathologique aux infections constitue dans la plupart des cas le symptôme cardinal d'une immunodéficience primaire et est définie par l'acronyme «ELVIS».
«ELVIS»: pathogènes opportunistes, localisation inhabituelle, évolution prolongée, intensité d'infections graves, somme des infections
2. Les troubles de l'immunorégulation associés à des manifestations cliniques typiques sont définis par l'acronyme «GARFIELD».
«GARFIELD»: granulome, auto-immunité, fièvre récurrente, maladies cutanées eczémateuses, lymphoprolifération et inflammation chronique de l'intestin.
3. Perte de poids, accompagnée la plupart du temps de diarrhées
4. Antécédents familiaux anormaux (p. ex. consanguinité, immunodéficience, prédisposition pathologique aux infections)
5. Résultats d'examen anormaux

La présence d'une immunodéficience primaire est possible si au moins un des signes existe. En cas de soupçon d'une immunodéficience primaire, il convient de contacter un médecin expérimenté dans le diagnostic et la prise en charge des immunodéficiences.

* Société Européenne pour les immunodéficiences: www.esid.org/clinical-6-warning-signs-for-pid-in-adults

** S. Farmand et al.: lignes directrices de l'AWMF relatives au diagnostic d'immunodéficiences primaires «Diagnostik von primären Immundefekten» (2011) www.awmf.org/leitlinien/detail/II/027-050.html

AWMF: groupe de travail des sociétés scientifiques et médicales allemandes