

Az elsődleges immunhiányos betegség (PID) tíz figyelmeztető jele – Általános:

(www.esid.org)

1. Négy vagy több új fülfertőzés 1 éven belül
2. Két vagy több súlyos orrmelléküreg-fertőzés 1 éven belül
3. Két vagy több hónapos hatástalan antibiotikumkezelés
4. Két vagy több tüdőgyulladás 1 éven belül
5. A csecsemő testsúlya nem gyarapodik, vagy a gyermek nem fejlődik normálisan
6. Visszatérő, mély bőr- vagy szervi tályogok
7. Tartósan fennálló szájpenész vagy gombás bőrfertőzések
8. Intravénás antibiotikumokra van szükség a fertőzések felszámolásához
9. Két vagy több súlyos fertőzés, a szepszist is ideértve
10. PID a családi kórtörténetben

A hat figyelmeztető jel a felnőttkori PID esetében:

1. Négy vagy több, antibiotikumkezelést igénylő fertőzés egy éven belül
(fülgulladás, hörghurut, orrmelléküreg-gyulladás, tüdőgyulladás)
2. Visszatérő fertőzések vagy hosszan tartó antibiotikumkezelést igénylő fertőzés
3. Két vagy több, súlyos bakteriális fertőzés (csont- és csontbőr-gyulladás, agyhártyagyulladás, szepszis, cellulitis)
4. Két vagy több röntgenvizsgálattal igazolt tüdőgyulladás 3 éven belül
5. Szokatlan lokalizációjú vagy szokatlan kórokozó okozta fertőzés
6. PID a családban